



Zum Einnehmen.
Eine Tablette enthält 10 mg Riboflavin.
Enthält Lactose. Packungsbeilage beachten.
Nicht über 25°C lagern. Die Blisterpackung im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht und Feuchtigkeit zu schützen.

Vitamin B₂ 10 mg

JENAPHARM®

Tabletten
Riboflavin

Bei Vitamin-B₂-Mangelzuständen



20 Tabletten

mibe

Vitamin B₂ 10 mg
JENAPHARM®
20 Tabletten

Zum Einnehmen.

Eine Tablette enthält 10mg Riboflavin.

Enthält Lactose. Packungsbeilage beachten.

Nicht über 25°C lagern. Die Blisterverpackung im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht und Feuchtigkeit zu schützen.



Ch.-B. Verwendbar bis:

15.12.04

Vitamin B₂ 10 mg

JENAPHARM®

Tabletten
Riboflavin

Bei Vitamin-B₂-Mangelzuständen



20 Tabletten

mibe



Zum Einnehmen.

Eine Tablette enthält 10 mg Riboflavin.
Enthält Lactose. Packungsbeilage beachten.
Nicht über 25 °C lagern. Die Blisterpackung im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht und Feuchtigkeit zu schützen.

Vitamin B₂ 10 mg
JENAPHARM®
20 Tabletten



Zum Einnehmen.

Eine Tablette enthält 10 mg Riboflavin.

Enthält Lactose. Packungsbeilage beachten.

Nicht über 25 °C lagern. Die Blisterpackung im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht und Feuchtigkeit zu schützen.



Zum Einnehmen.
Eine Tablette enthält 10 mg Riboflavin.
Enthält Lactose. Packungsbeilage beachten.
Nicht über 25 °C lagern. Die Blisterpackung im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht und Feuchtigkeit zu schützen.

Vitamin B₂ 10 mg

JENAPHARM®

Tabletten
Riboflavin

Bei Vitamin-B₂-Mangelzuständen



20 Tabletten

mibo